



# van den borne aardappelen

## Lady Anna

CMK 93-042-005 x Fontane



Eigenschappen		Resistenties	
Rijptijd	Middenlaat	Aardappelmoeheld	Ro 1, 2, 3 en Pa2
Opbrengst	Goed	Wratzlekte	Fysio 1
Grofheid	Goed	Tabaksratelvirus	Vatbaar
Knolvorm	Lang	Phytophthora loof	Weinig resistent
Knolaantal	12-15	Phytophthora knol	Vrij resistent
Vleeskleur na koken	Licht geel	Schurft	Vrij resistent
Schilkleur	Geel	YN-virus	Vrij resistent
Besvorming	Matig	Yntn-virus tolerantie	Vrij resistent
Klemrust	Goed		
Opkomst	Trage begin loofontwikkeling		
Onderwatergewicht	430		

### Teeltadvies

**Bodem** : Niet op zandgronden die gevoelig zijn voor bruinverkleuring in het vlees/tabaksratelvirus. Bij voorkeur op gronden van 15% afslibbaar of hoger.

#### Plantafstand voor fritesaardappelen :

	35/45	40 cm
⚠ afhankelijk van de aantal knollen per 10 kg	45/50 (gesneden)	35 cm
uitgaande van een rijafstand van 75 cm	50/60 (gesneden)	38 cm

#### Bemesting :

- **Stikstof** : Verdelen over 3 giften: basgift van 200 kg N minus bodemvoorraad gevolgd door 2 giften van respectievelijk 50 en 25 kg N voor en na het sluiten van het gewas. De laatste gift bij voorkeur in de vorm van bladbemesting.
- **Fosfaat** : volgens advies bodemonderzoek.
- **Kali** : Adviesgift +30kg. Chloor houdende kali als overbemesting is geen probleem vanwege het hoge OWG.

**Bewaring** : Geschikt voor middellange tot lange bewaring (bewaartemperatuur ongeveer 7° C).

**Klemremming** : Gebruik van vloeibare klemremmer is mogelijk, maar de voorkeur is duidelijk om alleen te gassen.

**Voorzorgsmaatregelen** : Poten: niet te vroeg, niet te diep (op maaiveld) en niet in koude grond. Pootgoed goed los laten komen, kiemen niet beschadigen. Diep rooien. Na rooien zo snel mogelijk droog ventileren. Weinig gevoelig voor Sencor.

Aan deze rasbeschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.